

q -Abel-Zeilberger算法与 q -超调和数恒等式

周梦肖

天津职业技术师范大学理学院, 天津

收稿日期: 2024年9月9日; 录用日期: 2024年10月9日; 发布日期: 2024年10月15日

摘要

本文将Abel引理与 q -Zeilberger算法相结合来研究 q -非超几何和式。对一类含有 q -超调和数的相关和式, 得到了一些新的 q -模拟恒等式。

关键词

q -超调和数, q -Gosper算法, q -Zeilberger算法, Abel引理

q -Abel-Zeilberger Algorithm and q -Hyperharmonic Numbers Identities

Mengxiao Zhou

School of Science, Tianjin University of Technology and Education, Tianjin

Received: Sep. 9th, 2024; accepted: Oct. 9th, 2024; published: Oct. 15th, 2024

Abstract

This article combines Abel's lemma with q -Zeilberger algorithm to study q -non-hypergeometric sums. For a class of related sum of q -hyperharmonic numbers, some new q -analogous identities are obtained.

Keywords

q -Hyperharmonic Numbers, q -Gosper Algorithm, q -Zeilberger Algorithm, Abel's Lemma

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

文章引用: 周梦肖. q -Abel-Zeilberger 算法与 q -超调和数恒等式[J]. 理论数学, 2024, 14(10): 101-107.

DOI: 10.12677/pm.2024.1410349

1. 引言

对于正整数 n , 经典调和数的定义为

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}. \quad (1.1)$$

为了方便, 约定 $H_0 = 0$ 。近些年来, 调和数恒等式的发现与证明受到研究者的广泛关注, 相关恒等式可见[1]-[5]。

经典调和数有多种扩展形式。例如, 对正整数 n, r , Conway 和 Guy [6]定义了调和数的如下扩展, 称为 r 阶超调和数

$$H(n, r) = \sum_{t=1}^n H(t, r-1), \quad (1.2)$$

其中 $H(n, 0) = \frac{1}{n}$ 。同理, 约定当 $n \leq 0$ 或 $r < 0$ 时, 有 $H(n, r) = 0$ 。

本文主要研究 q -调和数(即调和数的 q -模拟)的相关恒等式。恒等式的 q -模拟及其组合证明是组合数学的研究热点, 它的快速发展对理论物理学, 计算机科学的发展起到了重要的推动作用。

定义 1 对于正整数 n , 两种常见的 q -调和数定义如下[7]:

$$H_q(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{[k]}, \quad \tilde{H}_q(n) = \sum_{k=1}^n \frac{q^k}{[k]}. \quad (1.3)$$

其中 $[k] = \frac{1-q^k}{1-q}$, 同时约定 $H_q(0) = \tilde{H}_q(0) = 0$, 注意当 $q \rightarrow 1$ 时, $[k] \rightarrow k$ 。

Mansour 和 Shattuck [8]给出了如下的 q -超调和数。

定义 2 对正整数 n, r , r 阶 q -超调和数定义为

$$H_q(n, r) = \sum_{t=1}^n q^t H_q(t, r-1), \quad (1.4)$$

其中 $H_q(n, 0) = \frac{1}{q[n]}$, $H_q(n, 1) = \frac{1}{q} \tilde{H}_q(n)$ 。

定义 3 q -二项式系数 $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ 定义如下:

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = \frac{(q; q)_n}{(q; q)_k (q; q)_{n-k}}, \quad (1.5)$$

其中 $(a; q)_n = (1-a)(1-aq)(1-aq^2) \cdots (1-aq^{n-1})$, 约定 $(a; q)_0 = 1$ 。

注意当 $k > n$ 或 $k < 0$ 时, $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = 0$ 。

给定一个恒等式, 寻找其 q -模拟恒等式是十分重要的。例如, 对超调和数恒等式:

$$\sum_{k=m}^{n-1} \binom{k}{m} H(k, 2) = \binom{n}{m+1} H(n, 2) - \binom{n+1}{m+2} \left(H_{n+1} - \frac{1}{m+2} \right), \quad n \geq 1. \quad (1.6)$$

有如下 q -模拟恒等式[9]

$$\sum_{k=m}^{n-1} q^{k-m} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} H_q(k, 2) = \begin{bmatrix} n \\ m+1 \end{bmatrix} H_q(n, 2) - q^{m+1} \begin{bmatrix} n+1 \\ m+2 \end{bmatrix} \left(H_q(n+1, 1) - \frac{q^{m+1}}{[m+2]} \right), \quad n \geq 1. \quad (1.7)$$

目前,对超几何和式,可采用经典的超几何算法(如 Gosper 算法和 Zeilberger 算法)进行处理。注意到调和数及 q -调和数是非超几何项,因此相关和式需采用其他方法。例如,Chen, Hou 和 Jin [10]将 Abel 引理与 Gosper 算法, Zeilberger 算法相结合,提出了 Abel-Zeilberger 算法并给出了大量调和数相关恒等式的新证明。Xu [11]和 Chu [12]等将 Abel 引理用于研究 q -级数相关等式。沿着该思路,本文将 Abel 引理与 q -Zeilberger 算法相结合(称为 q -Abel-Zeilberger 算法)来研究含有 q -非超几何项的相关和式。特别是,对如下和式的 q -模拟,得到了相关 q -恒等式。

$$S(n, m, r) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k k^m H(k, r). \quad (1.8)$$

2. 基础知识

引理 2.1 (Abel 引理)对于两个任意的序列 $\{a_k\}, \{b_k\}$, 有

$$\sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) b_k = \sum_{k=m}^{n-1} a_{k+1} (b_k - b_{k+1}) + a_n b_n - a_m b_m. \quad (2.1)$$

利用差分算子可将上式改写为

$$\sum_{k=m}^{n-1} b_k \Delta a_k = - \sum_{k=m}^{n-1} a_{k+1} \Delta b_k + a_n b_n - a_m b_m. \quad (2.2)$$

注: Δ 是关于 k 的差分算子。

Zeilberger 算法用来处理定和问题。给定一个 q -超几何项 $F(n, k)$, 其中 $\frac{F(n, k+1)}{F(n, k)}$ 都是关于 q^n, q^k 的有理函数, q -Zeilberger 试着求出多项式 $a_0(q^n), \dots, a_d(q^n)$ 和有理函数 $R(q^n, q^k)$, 使得

$$a_0(q^n)F(n, k) + a_1(q^n)F(n+1, k) + \dots + a_d(q^n)F(n+d, k) = \Delta R(q^n, q^k)F(n, k). \quad (2.3)$$

对该斜递推关系关于 k 求和, 就可得到如下和式的递推关系

$$S(n) = \sum_k F(n, k). \quad (2.4)$$

有关超几何算法的更多细节, 可见参考文献[13]。

对给定和式 $S(n) = \sum_k F(n, k) b_k$, 其中 $F(n, k)$ 和 Δb_k 均是 q -超几何项, q -Abel-Zeilberger 算法的基本步骤如下:

1) 对超几何项 $F(n, k)$, 利用 q -Gosper 算法或 q -Zeilberger 算法得到其不定和或斜递推关系。

$$a_0(q^n)F(n, k) + a_1(q^n)F(n+1, k) + \dots + a_d(q^n)F(n+d, k) = \Delta G(n, k), \quad (2.5)$$

其中 $G(n, k) = R(q^n, q^k)F(n, k)$.

2) 在上述关系式两端同乘 b_k 并对变量 k 求和, 得到

$$a_0(q^n)S(n) + a_1(q^n)S(n+1) + \dots + a_d(q^n)S(n+d) = \sum_k \Delta G(n, k) b_k. \quad (2.6)$$

3) 对等式右端利用 Abel 引理可得

$$a_0(q^n)S(n) + a_1(q^n)S(n+1) + \dots + a_d(q^n)S(n+d) = - \sum_k G(n, k+1) \Delta b_k + W(n). \quad (2.7)$$

注意到由于 Δb_k 为 q -超几何项, 因此右端和式由 q -非超几何和式转化为 q -超几何和式。此外, 多数情况下, 余项 $W(n) = 0$ 。

4) 令 $T(n) = \sum_k G(n, k+1) \Delta b_k$, 若可利用 q -Zeilberger 算法找到 $T(n)$ 的闭形式, 则可得到 $S(n)$ 满足的递推关系。

3. 主要结论

对如下和式:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^m H_k^{(p)}.$$

对给定参数 (n, m, p) , 该和式的对应恒等式已被多人发现和证明。本文将上式中广义调和数 $H_k^{(p)}$, 替换为超调和数 $H(k, r)$, 研究下列和式的 q -模拟恒等式。

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (-1)^k k^m H(k, r).$$

定理 3.1 对于非负整数 m, n 且 $n > m+1$, 有

$$S_q(n, m, 2) = \sum_{k=0}^n (-1)^k q^{\binom{k+1}{2} - n(k+1)} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} H_q(k, 2) = \frac{(-1)^m q^{-\binom{m+1}{2} + n - m - 2} (1 - q^{m+1})}{[n-m](1 - q^{n-m-1})}. \quad (3.1)$$

证明. 令

$$F(n, k) = (-1)^k q^{\binom{k+1}{2} - n(k+1)} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix}. \quad (3.2)$$

则由 q -Gosper 算法可知

$$F(n, k) = G(n, k+1) - G(n, k), \quad (3.3)$$

其中

$$G(n, k) = -\frac{q^n (q^m - q^k)}{q^k (q^m - q^n)} F(n, k). \quad (3.4)$$

注意到求和范围等价于从 0 到 $+\infty$, 因此对(3.3)式两边同乘 $H_q(k, 2)$ 并对 k 从 0 到 $+\infty$ 求和, 利用 Abel 引理可得(注意其余项为零)

$$\begin{aligned} S_q(n, m, 2) &= \sum_{k=0}^n \Delta G(n, k) H_q(k, 2) \\ &= -\sum_{k=0}^{+\infty} G(n, k+1) q^k \tilde{H}_q(k+1) \\ &= -T(n). \end{aligned} \quad (3.5)$$

令

$$F_1(n, k) = G(n, k+1) q^k. \quad (3.6)$$

则由 q -Gosper 算法可知

$$F_1(n, k) = G_1(n, k+1) - G_1(n, k). \quad (3.7)$$

其中

$$G_1(n, k) = -\frac{q^n(q^m - q^k)}{(q^{m+1} - q^n)q^k} F_1(n, k). \quad (3.8)$$

注意到求和范围等价于从 0 到 $+\infty$ 求, 因此对(3.7)式两边同乘 $\tilde{H}_q(k+1)$ 并对 k 从 0 到 $+\infty$ 求和, 进一步利用 Abel 引理可得(注意其余项为零)

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \Delta G_1(n, k) \tilde{H}_q(k+1) \\ &= -\sum_{k=0}^{+\infty} G_1(n, k+1) \frac{(1-q)q^{k+2}}{1-q^{k+2}} \\ &= -Z(n). \end{aligned} \quad (3.9)$$

设

$$F_2(n, k) = G_1(n, k+1) \frac{(1-q)q^{k+2}}{1-q^{k+2}}, \quad (3.10)$$

由 q -Zeilberger 算法可知

$$(q^{m+1} - q^n)F_2(n, k) - (q^m - q^{n+1})F_2(n+1, k) = G_2(n, k+1) - G_2(n, k). \quad (3.11)$$

其中

$$G_2(n, k) = -\frac{q^n(q^{k+2} - 1)(q^m - q^k)}{q^{k+1}(q^{k+1} - q^n)} F_2(n, k). \quad (3.12)$$

对(3.11)式两边 k 从 0 到 $+\infty$ 求和, 得到

$$(q^{m+1} - q^n)Z(n) - (q^m - q^{n+1})Z(n+1) = 0. \quad (3.13)$$

由初始值

$$Z(m+2) = \frac{(-1)^m q^{-\binom{m+1}{2}} (q^{m+1} - 1)}{q^2 - 1}, \quad (3.14)$$

得

$$S_q(n, m, 2) = Z(n) = \frac{(-1)^m q^{-\binom{m+1}{2} + n - m - 2} (1 - q^{m+1})}{[n - m](1 - q^{n-m-1})}. \quad (3.15)$$

特别的, 当 $m=0, 1, 2$, 可以得到

$$1 = \begin{bmatrix} k \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [k] = \begin{bmatrix} k \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [k]^2 = \begin{bmatrix} k \\ 1 \end{bmatrix} + q(q+1) \begin{bmatrix} k \\ 2 \end{bmatrix}, \quad (3.16)$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k q^{\binom{k+1}{2} - n(k+1)} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} H_q(k, 2) = \frac{q^{n-2}}{[n][n-1]}, \quad n > 1, \quad (3.17)$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k q^{\binom{k+1}{2} - n(k+1)} [k] \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} H_q(k, 2) = -\frac{q^{n-4}(1+q)}{[n-1][n-2]}, \quad n > 2, \quad (3.18)$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k q^{\binom{k+1}{2} - n(k+1)} [k]^2 \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} H_q(k, 2) = \frac{(1+q)(-q^{2n+1} - q^{2n} + q^{n+1} + q^n)}{(1-q)q^6 [n-1][n-2][n-3]}, \quad n > 3. \quad (3.19)$$

运用同样的方法, 可以得到下列 q -模拟恒等式

定理 3.2 对于非负整数 m, n 且 $n > m + 2$, 有

$$S_q(n, m, 3) = \sum_{k=0}^n (-1)^k q^{\binom{k+1}{2} - n(k+1)} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} H_q(k, 3) = \frac{(-1)^{m+1} q^{-\binom{m+1}{2} + 2n - 2m - 4} [m+1][m+2]}{[n-m][n-m-1][n-m-2]}. \quad (3.20)$$

特别的, 当 $m = 0, 1, 2$, 可以得到

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k q^{\binom{k+1}{2} - n(k+1)} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} H_q(k, 3) = -\frac{q^{2n-4}(1+q)}{[n][n-1][n-2]}, \quad n > 3, \quad (3.21)$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k q^{\binom{k+1}{2} - n(k+1)} [k] \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} H_q(k, 3) = \frac{q^{2n-7}(1+q)(1+q+q^2)}{[n-1][n-2][n-3]}, \quad n > 4, \quad (3.22)$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k q^{\binom{k+1}{2} - n(k+1)} [k]^2 \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} H_q(k, 3) = -\frac{q^{2n-10}(1+q)(1+q+q^2)^2 [n]}{[n-1][n-2][n-3][n-4]}, \quad n > 5. \quad (3.23)$$

4. 总结

对给定和式 $S(n) = \sum F(n, k) b_k$, 其中 $F(n, k)$ 和 Δb_k 均是 q -超几何项, 本文将 Abel 引理与 q -Zeilberger 算法相结合(称为 q -Abel-Zeilberger 算法)来得到 $S(n)$ 满足的递推关系, 进而证明或发现恒等式。特别的, 对超调和数, 我们得到了如下和式的 q -模拟恒等式。

$$S(n, m, r) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k k^m H(k, r), \quad r = 1, 2.$$

注意到该算法的适用性, 未来可以进一步考虑其在 q -无穷级数和其他 q -非超几何和式等方面的应用。

参考文献

- [1] Boyadzhiev, K.N. (2014) Binomial Transform and the Backward Difference. *Mathematics*, **13**, 43-63.
- [2] Chen, K. and Chen, Y. (2020) Infinite Series Containing Generalized Harmonic Functions. *Notes on Number Theory and Discrete Mathematics*, **26**, 85-104. <https://doi.org/10.7546/nntdm.2020.26.2.85-104>
- [3] Chu, W. and De Donno, L. (2005) Hypergeometric Series and Harmonic Number Identities. *Advances in Applied Mathematics*, **34**, 123-137. <https://doi.org/10.1016/j.aam.2004.05.003>
- [4] Frontczak, R. (2021) Binomial Sums with Skew-Harmonic Numbers. *Palestine Journal of Mathematics*, **10**, 756-763.
- [5] Guo, D.W. (2022) Some Combinatorial Identities Concerning Harmonic Numbers and Binomial Coefficients. *Discrete Mathematics Letters*, **8**, 41-48.
- [6] Conway, J.H. and Guy, R.K. (1996) *The Book of Numbers*. Copernicus.
- [7] Mansour, T., Mansour, M. and Song, C.W. (2012) q -Analogues of Identities Involving Harmonic Numbers and Binomial Coefficients. *Applications and Applied Mathematics*, **7**, 22-36.
- [8] Mansour, T. and Shattuck, M. (2012) A q -Analog of the Hyperharmonic Numbers. *Afrika Matematika*, **25**, 147-160. <https://doi.org/10.1007/s13370-012-0106-6>
- [9] Kızılates, C. and Tuğlu, N. (2015) Some Combinatorial Identities of q -Harmonic and q -Hyperharmonic Numbers. *Communications in Mathematics and Applications*, **6**, 33-40.
- [10] Chen, W.Y.C., Hou, Q. and Jin, H. (2011) The Abel-Zeilberger Algorithm. *The Electronic Journal of Combinatorics*, **18**, Article No. 17. <https://doi.org/10.37236/2013>

-
- [11] Xu, J. and Ma, X. (2024) General q -Series Transformations Based on Abel's Lemma on Summation by Parts and Their Applications. *Journal of Difference Equations and Applications*, **30**, 553-576. <https://doi.org/10.1080/10236198.2024.2302379>
- [12] Chu, W. and Wang, C. (2009) Abel's Lemma on Summation by Parts and Partial Q -Series Transformations. *Science in China Series A: Mathematics*, **52**, 720-748. <https://doi.org/10.1007/s11425-008-0173-1>
- [13] Petkovšek, M., Wilf, H.S. and Zeilberger, D. (1996) *A = B*. A.K. Peters Ltd.