一类奇异纽结的着色Jones多项式

郭延泽, 李 佳, 冷旭东

辽宁师范大学数学学院, 辽宁 大连

收稿日期: 2025年6月19日; 录用日期: 2025年7月10日; 发布日期: 2025年7月22日

摘 要

本文计算了一类 m 股奇异排叉结的 $2n$ 着色Jones多项式, 该算法的核心技巧在于对Temperley-Lieb代数中的融合、三角等变换的合理运用。

关键词

Jones多项式, 奇异纽结, 排叉结

Colored Jones Polynomials of a Class of Singular Knots

Yanze Guo, Jia Li, Xudong Leng

School of Mathematics, Liaoning Normal University, Dalian Liaoning

Received: Jun. 19th, 2025; accepted: Jul. 10th, 2025; published: Jul. 22nd, 2025

Abstract

This paper computes the $2n$ -colored Jones polynomial of a class of m -strand singular pretzel links. The core technique of the algorithm lies in the judicious application of fusion, triangular transformations, and related operations in the Temperley-Lieb algebra.

Keywords

Jones Polynomial, Singular Knots, Pretzel Knots

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

文章引用: 郭延泽, 李佳, 冷旭东. 一类奇异纽结的着色 Jones 多项式[J]. 理论数学, 2025, 15(7): 90-98.

DOI: 10.12677/pm.2025.157211

1. 引言

纽结的着色 Jones 多项式(Colored Jones Polynomial)是著名纽结不变量 Jones 多项式[1]的推广,它可由 Reshetikhin 和 Turaev [2]的量子群表示理论或者 Temperley-Lieb 代数[3]得到,是最具代表性的量子不变量。2018 年, Elhamedi 和 Hajij [4]定义了奇异纽结(Singular Knot),即空间四价图的 $2n$ 着色琼斯多项式。本文将沿用这一定义并运用 Temperley-Lieb 代数的技巧计算一类奇异纽结的着色 Jones 多项式。

2. 预备知识

定义 2.1 [4]: 一个图 G 被称为嵌入四价图,如果图中每个顶点的度数都为 4 (即每个顶点连接 4 条边),并且这个图被嵌入到空间 R^3 中。如果其顶点连接各边的顺序不能改变,那么这种图就被称为刚性四价图,刚性四价图称为奇异纽结。如图 1 为一个奇异交叉点。

Figure 1. Singular crossing
图 1. 奇异交叉点

定义 2.2 [5]: Kauffman 关系式

$$\begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} = A \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \end{array} + A^{-1} \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \end{array} \quad \left(\mathbf{D} \cup \bigcirc = -(A^2 - A^{-2}) \mathbf{D} \right).$$

这里 $\mathbf{D}$ 表示任意纽结或者缠结图。

为了阐明下面的 Temperley-Lieb 代数,我们首先定义基本缠结 $U_1, U_2, \dots, U_{n-1}$ 。

定义 2.3 [3]: 我们定义基本缠结 $U_1, U_2, \dots, U_{n-1} \in T_n$, 这里 T_n 表示 n 股的 Temperley-Lieb 代数,即每个 U_i 是 n 条输入和 n 条输出链的缠结,如图 2 所示为 T_4 中的缠结 $1_4, U_1, U_2, U_3$ 。

Figure 2. The tangles $1_4, U_1, U_2, U_3$ of T_4

图 2. T_4 中的缠结 $1_4, U_1, U_2, U_3$

U_i 的乘积完全由输入端和输出端的连接确定,通过将第一个纽结的输出股线连接到第二个纽结的输入股线。

Temperley-Lieb 代数是 $Z[A, A^{-1}]$ 上的自由加性代数,具有生成元 $1_n, U_1, U_2, \dots, U_{n-1}$ 且满足以下给出

的关系:

- (1) $U_i^2 = dU_i$, 这里 d 表示封闭圆环的值;
- (2) $U_i U_{i\pm 1} U_i = U_i$;
- (3) $U_i U_j = U_j U_i$ 。这里 $|i - j| > 1$ 。

我们取 $d = -A^2 - A^{-2}$, 这里 A 和 A^{-1} 与 T_n 中的所有元素可交换。

引理 2.4 [3]: T_n 中的元素 f_i ($i = 0, 1, 2, \dots, n-1$) 由以下公式归纳定义:

$$f_0 = 1_n$$

$$f_{k+1} = f_k - \mu_{k+1} f_k U_{k+1} f_k$$

这里 $\mu_1 = d^{-1}$, $\mu_{k+1} = (d - \mu_k)^{-1}$, $d = -A^2 - A^{-2}$, $U_i^2 = dU_i$ 。
通常我们用一个小方盒子表示 T_n 中的元素 f_n 。

定义 2.5 [3]: 定义元素 $\Delta_n \in S(\mathbb{R}^2)$ 为 $f^{(n)}$ 的闭包, 如图 3 所示。

Figure 3. The closures of $f^{(n)}$
图 3. $f^{(n)}$ 的闭包

命题 2.6 [3]: T_n 中的元素 f_i 有以下性质:

- (1) 幂等性: $f_i^2 = f_i$, 其中 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 。
- (2) $f_i U_j = U_j f_i = 0$, 其中 $j \geq i$ 。
- (3) $\text{tr}(f_{n-1}) = \Delta_n = \Delta_n(-A^2)$, 其中 $\mu_{k+1} = \Delta_k / \Delta_{k+1}$, $\Delta_0 = 1$ 。

这里 $\Delta_n(x) = \left(\frac{x^{n+1} - x^{-n-1}}{x - x^{-1}} \right)$ 是 n 阶切比雪夫多项式。

命题 2.7 [3]: 元素 f_i 的幂等性可以延伸出以下结果。

定义 2.8 [4]: 在纽结理论中, 着色是指对图的每一条边 e 赋予一个颜色, 颜色取自某个特定的集合或代数结构。

为了将三价顶点与 Temperley-Lieb 代数中的元素联系起来, 我们做以下定义:

定义 2.9 [3]: 将顶点上的每条线标记为正整数 a, b 或 c , 假设 $(a+b-c)$ 、 $(a+c-b)$ 和 $(b+c-a)$ 都是正偶数。那么令 $i = \frac{(a+b-c)}{2}$, $j = \frac{(a+c-b)}{2}$, $k = \frac{(b+c-a)}{2}$, 则三价顶点由以图 4 等式定义:

Figure 4. 3-valent vertex
图 4. 三价顶点

当 (a, b, c) 是可容许的, 三价图中的 $i = \frac{(a+b-c)}{2}$ 、 $j = \frac{(a+c-b)}{2}$ 、 $k = \frac{(b+c-a)}{2}$ 被称为内部着色。

定义 2.10 [4]: 设 L 是一个奇异链环, 对于任意整数 $n \geq 1$, $[L]_{2n}$ 按以下规则定义:

定义 2.11 [4]: 定义奇异纽结 K 的标准着色琼斯多项式:

$$J_{2n+1, K(q)} = \frac{1}{\Delta_{2n}} [K]_{2n}$$

定义 2.12 [4]: 一个非负三元组 (a, b, c) 是可容许的, 如果 $a+b+c$ 是偶数并且 $a+b \geq c \geq |a-b|$ 。以下事实是我们在论文计算中要用到的。

命题 2.13 [4]: 一些恒等式

这里 $R_{n,i} = \frac{\theta(2n, 2n, 2i)^{k-1}}{\theta(n, n, 2i)^k} \Delta_{2i}$ 。

证明：由命题 2.13 中的等式(1)和(4)，我们可以得到：

$$\begin{array}{c} 2n \quad n \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad n \quad 2n \end{array} = \sum_{i=0}^n \frac{\Delta_{2i}}{\theta(n, n, 2i)} \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array} = \sum_{i=0}^n B_{n,i} \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array}$$

其中， $B_{n,i} = \left(\frac{Tet \left[\begin{array}{c} 2i, n, n \\ n, 2n, 2n \end{array} \right]}{\theta(2n, 2n, 2i)} \right)^2 \frac{\Delta_{2i}}{\theta(n, n, 2i)}$ 。

而

$$\begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array} = \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array} = \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array} = \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array}$$

注意：第二个等号可由命题 2.7 得出。

所以

$$Tet \left[\begin{array}{c} 2i, n, n \\ n, 2n, 2n \end{array} \right] = \theta(2n, 2n, 2i), \quad B_{n,i} = \frac{\Delta_{2i}}{\theta(n, n, 2i)}$$

另外，因为

$$\begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array} = \sum_{i=0}^n B_{n,i} \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array} \\ = \sum_{i=0}^n B_{n,i} \delta_{2i}^{2i} \frac{\theta(2i, 2n, 2n)}{\Delta_{2i}} \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array} = \sum_{i=0}^n \frac{\theta(2i, 2n, 2n)}{\theta(n, n, 2i)} \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array}$$

所以

$$\begin{array}{c} 2n \quad n \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad n \quad 2n \end{array}^k = \sum_{i=0}^n B_{n,i} \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array} \otimes \begin{array}{c} 2n \quad n \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad n \quad 2n \end{array}^{k-1} \\ = \sum_{i=0}^n B_{n,i} \left(\frac{\theta(2i, 2n, 2n)}{\theta(n, n, 2i)} \right)^{k-1} \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array} = \sum_{i=0}^n \frac{\theta(2n, 2n, 2i)^{k-1} \Delta_{2i}}{\theta(n, n, 2i)^k} \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array} \\ = \sum_{i=0}^n R_{n,i} \begin{array}{c} 2n \quad 2i \quad 2n \\ \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ 2n \quad 2i \quad 2n \end{array} \quad \text{。其中 } R_{n,i} = \frac{\theta(2n, 2n, 2i)^{k-1}}{\theta(n, n, 2i)^k} \Delta_{2i} \text{。}$$

下面我们计算如图 5 所示的着色琼斯多项式，记图 5 为 $G_{l_1 l_2 \dots l_m}^{k_1 k_2 \dots k_m}$ 。注意：所有未标注着色均为 $2n$ 。

Figure 5. m -strand pretzel singular knots
图 5. m 股排叉奇异纽结

定理 3.2:

$$J_{2n} \left(G_{l_1 l_2 \dots l_m}^{k_1 k_2 \dots k_m} \right) = \frac{1}{\Delta_{2n}} C_1 C_2 \dots C_m \sum_{j=0}^n \left(\frac{\Delta_{2j}}{\theta(2n, 2n, 2j)} \right)^{m-1} \frac{Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_1, 2n, 2n \end{bmatrix} Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_2, 2n, 2n \end{bmatrix} \dots Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_m, 2n, 2n \end{bmatrix}}{\theta(2j, 2n, 2n)^2 \Delta_{2j}^{m-2}} \theta(2n, 2n, 2j)$$

证明：由引理 3.1 和命题 2.13 中的交叉融合等式：

$$J_{2n} \left(G_{l_1 l_2 \dots l_m}^{k_1 k_2 \dots k_m} \right) = \frac{1}{\Delta_{2n}} C_1 C_2 \dots C_m$$

其中， $C_a = \sum_{i_a=0}^n \frac{\theta(2n, 2n, 2i_a)^{k-1} \Delta_{2i_a} (\lambda_{2n, 2n}^{2i_a})^l}{\theta(n, n, 2i_a)^k}$ 。

我们可以运用命题 2.13 中的融合等式，得到以下等式：

$$J_{2n} \left(G_{l_1 l_2 \dots l_m}^{k_1 k_2 \dots k_m} \right) = \frac{1}{\Delta_{2n}} C_1 C_2 \dots C_m \sum_{j_1=0}^n \frac{\Delta_{2j_1}}{\theta(2n, 2n, 2j_1)} \sum_{j_2=0}^n \frac{\Delta_{2j_2}}{\theta(2n, 2n, 2j_2)} \dots \sum_{j_{m-1}=0}^n \frac{\Delta_{2j_{m-1}}}{\theta(2n, 2n, 2j_{m-1})}$$

$$= \frac{1}{\Delta_{2n}} C_1 C_2 \cdots C_m \sum_{j_1=0}^n \frac{\Delta_{2j_1}}{\theta(2n, 2n, 2j_1)} \sum_{j_2=0}^n \frac{\Delta_{2j_2}}{\theta(2n, 2n, 2j_2)} \cdots \sum_{j_{m-1}=0}^n \frac{\Delta_{2j_{m-1}}}{\theta(2n, 2n, 2j_{m-1})} \frac{Tet \begin{bmatrix} 2j_1, 2n, 2n \\ 2i_1, 2n, 2n \end{bmatrix}}{\theta(2j_1, 2n, 2n)}$$

$$\frac{Tet \begin{bmatrix} 2j_2, 2n, 2n \\ 2i_2, 2n, 2n \end{bmatrix}}{\theta(2j_2, 2n, 2n)} \cdots \frac{Tet \begin{bmatrix} 2j_{m-1}, 2n, 2n \\ 2i_{m-1}, 2n, 2n \end{bmatrix}}{\theta(2j_{m-1}, 2n, 2n)} \frac{Tet \begin{bmatrix} 2j_{m-1}, 2n, 2n \\ 2i_m, 2n, 2n \end{bmatrix}}{\theta(2j_{m-1}, 2n, 2n)}$$

在上一步中, 我们根据命题 2.13 中的(4)做了 m 次三角变换。

由命题 2.13 的(6), 当且仅当 $j_1 = j_2 = \cdots = j_{m-1}$ 时, 上式中图形才不为 0, 所以令 $j = j_1 = j_2 = \cdots = j_{m-1}$,

$$\text{则 } J_{2n} \left(G \begin{matrix} k_1 k_2 \cdots k_m \\ l_1 l_2 \cdots l_m \end{matrix} \right)$$

$$= \frac{1}{\Delta_{2n}} C_1 C_2 \cdots C_m \sum_{j=0}^n \left(\frac{\Delta_{2j}}{\theta(2n, 2n, 2j)} \right)^{m-1} \frac{Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_1, 2n, 2n \end{bmatrix} Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_2, 2n, 2n \end{bmatrix} \cdots Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_m, 2n, 2n \end{bmatrix}}{\theta(2j, 2n, 2n)^m} \left(\frac{\theta(2j, 2n, 2n)}{\Delta_{2j}} \right)^{m-2}$$

$$= \frac{1}{\Delta_{2n}} C_1 C_2 \cdots C_m \sum_{j=0}^n \left(\frac{\Delta_{2j}}{\theta(2n, 2n, 2j)} \right)^{m-1} \frac{Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_1, 2n, 2n \end{bmatrix} Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_2, 2n, 2n \end{bmatrix} \cdots Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_m, 2n, 2n \end{bmatrix}}{\theta(2j, 2n, 2n)^m}$$

$$\left(\frac{\theta(2j, 2n, 2n)}{\Delta_{2j}} \right)^{m-2} \theta(2n, 2n, 2j)$$

$$= \frac{1}{\Delta_{2n}} C_1 C_2 \cdots C_m \sum_{j=0}^n \left(\frac{\Delta_{2j}}{\theta(2n, 2n, 2j)} \right)^{m-1} \frac{Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_1, 2n, 2n \end{bmatrix} Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_2, 2n, 2n \end{bmatrix} \cdots Tet \begin{bmatrix} 2j, 2n, 2n \\ 2i_m, 2n, 2n \end{bmatrix}}{\theta(2j, 2n, 2n)^2 \Delta_{2j}^{m-2}} \theta(2n, 2n, 2j)$$

4. 总结

本文研究了一类奇异纽结的着色 Jones 多项式的计算方法, 通过对奇异纽结投影图与 Temperley-Lieb 代数中的元素建立关系, 运用融合等式、三角变换等方法, 给出了 m 股奇异排叉结的 $2n$ 着色 Jones 多项式的计算公式。此算法具有一定普适性, 可以用来计算其他具有类似结构的奇异纽结的着色 Jones 多项式。

基金项目

国家自然科学基金项目(12001255)。

参考文献

- [1] Jones, V.F.R. (1985) A Polynomial Invariant for Knots via Von Neumann Algebras. *Bulletin of the American Mathematical Society*, **12**, 103-111. <https://doi.org/10.1090/S0273-0979-1985-15304-2>
- [2] Reshetikhin, N. and Turaev, V.G. (1991) Invariants of 3-Manifolds via Link Polynomials and Quantum Groups. *Inventiones*

Mathematicae, **103**, 547-597. <https://doi.org/10.1007/BF01239527>

- [3] Kauffman, L.H. and Lins, S.L. (1994) Temperley-Lieb Recoupling Theory and Invariants of 3-Manifolds. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400882533>
- [4] Elhamdadi, M. and Hajij, M. (2018) Foundations of the Colored Jones Polynomial of Singular Knots. *Bulletin of the Korean Mathematical Society*, **55**, 937-956.
- [5] Masbaum, G. and Vogel, P. (1994) 3-Valent Graphs and the Kauffman Bracket. *Pacific Journal of Mathematics*, **164**, 361-381. <https://doi.org/10.2140/pjm.1994.164.361>