

18pq阶5度对称图的分类

何古落*, 凌 波

云南民族大学数学与计算机科学学院, 云南 昆明

收稿日期: 2026年9月16日; 录用日期: 2026年10月19日; 发布日期: 2026年10月30日

摘 要

若一个图的自同构群在其弧集上是传递作用的, 则称该图为对称图。本文运用群论方法, 对所有可容许素数对 (p, q) , 完成了阶为 $18pq$ 的连通五度对称图的分类。确定了这类图的自同构群均为特定的有限几乎单群, 拓展了复合阶五度对称图已有的分类结果。

关键词

对称图, 自同构群, 正规商图

A Classification of Pentavalent Symmetric Graphs on $18pq$ Vertices

Guluo He*, Bo Ling

School of Mathematics and Computer Science, Yunnan Minzu University, Kunming Yunnan

Received: September 16, 2026; accepted: October 19, 2026; published: October 30, 2026

Abstract

A graph is symmetric if its automorphism group acts transitively on its arcs. Using group-theoretic methods, we classify all connected pentavalent symmetric graphs of order $18pq$ for each admissible pair (p, q) . The automorphism groups are determined as specific finite almost simple groups, extending known classifications of pentavalent symmetric graphs with composite orders.

Keywords

Symmetric Graph, Automorphism Group, Normal Quotient

*通讯作者。



1. 引言

对称图的研究可追溯至 Tutte 关于 3 度图的开创性工作[1] [2]。长期以来, 特定阶对称图的分类问题成为该领域的核心研究方向, 阶为 $p, 2p, 3p$ 以及 pq [3]-[6] 的对称图已得到完整的分类结果。Li 进一步刻画了奇数阶的传递图[7]。

近几十年来, 带度数限制的图分类问题受到广泛关注。Conder 与 Dobcsányi [8] 完成了顶点数不超过 768 的 3 度对称图的分类工作。对于 4 度情形, 周和冯[9]分类了阶为 $2pq$ 的 1-正则图。周与冯[10]得到了若干 5 度对称图族的重要基础结论, 学者们相继完成阶为 $12p, 8p, 24p, 30p, 2pq, 4pq, 18p$ [11]-[17] 的 5 度对称图的分类研究。此外, 无平方因子阶的五度 1-正则图与弧传递图已被完全分类[18] [19], 近期 Meymandi 等人完成阶为 $8pq$ 的五度对称图的分类工作[20]。

本文所讨论的图均为有限、简单、连通无向图。对于图 Γ , 记 $V\Gamma$, $E\Gamma$, $A\Gamma$ 和 $\text{Aut}\Gamma$ 分别为其顶点集、边集、弧集和全自同构群。设 G 是集合 Ω 上的置换群, 对 $\alpha \in \Omega$, 点稳定子 G_α 是 G 中固定点 α 的子群。若对任意 $\alpha \in \Omega$ 均有 $G_\alpha = 1$, 则称 G 在 Ω 上半正则; 若 G 在 Ω 上既传递又半正则, 则称 G 在 Ω 上正则。图 Γ 中的一条 s -弧是顶点构成的有序 $(s+1)$ -元组 $(v_0, v_1, \dots, v_s)$, 满足: 对 $1 \leq i \leq s$, v_{i-1} 与 v_i 相邻, 且对 $1 \leq i \leq s-1$, $v_{i-1} \neq v_{i+1}$ 。设 $G \leq \text{Aut}\Gamma$, 若 G 在 Γ 的全体 s -弧集上传递(相应地, 正则), 则称图 Γ 为 (G, s) -弧传递图(相应地, (G, s) -弧正则图)。若 G 在所有 s -弧上传递, 但不在 $(s+1)$ -弧上传递, 则称 Γ 是 (G, s) -传递图。当 $G = \text{Aut}\Gamma$ 时, 我们简称为 Γ 是 s -弧传递、 s -弧正则或 s -传递图。

阶为 $18p$ 与 $8pq$ 的五度对称图已得到完全分类, 而阶为 $18pq$, 且 $p > q \geq 5$, p, q 为互异素数的情形尚未解决。本文对现有研究成果进行补充与完善, 研究工作基于有限单群分类定理、有限群结构理论[21] [22], 并借助代数系统 GAP [23] 与 Magma [24] 开展辅助计算。本文限定素数满足条件 $p > q \geq 5$ 。当 $q < 5$, 即素数取 2 或 3 时, $18pq$ 的算术结构发生改变, 点稳定子的阶约束、候选有限单群集合均会显著变化, 构成独立的分类问题, 不在本文讨论范围之内。另外, 本文所采用的“正规商约化 + 有限单群分类”研究思路, 若直接迁移到其他阶、其他度数的对称图分类问题时, 将会面临点稳定子结构更加复杂、候选单群数量大幅增加等困难。下面给出本文的主要定理。

定理 1 设 (p, q) 为互异素数, 满足 $p > q \geq 5$, Γ 是阶为 $18pq$ 的连通五度弧传递图, 则 (p, q) 只能取 $(109, 11), (179, 89), (269, 67), (359, 179)$ 或者 $(719, 359)$ 。进一步, 设 $G = \text{Aut}\Gamma$, 图 Γ 、自同构群 G 及其点稳定子 G_α , 其中 $\alpha \in V\Gamma$ 的全部信息见表 1。下表汇总本文得到全部连通五度对称图, 包含图同构类、对应的自同构群、点稳定子 G_α 与素数参数约束, 该表格将用于后文几乎单群情形的全部结论汇总。

Table 1. Pentavalent symmetric graphs of order $18pq$

表 1. 阶为 $18pq$ 的 5 度对称

Γ	G	(p, q)	G_α
C_{21582}	$\text{PGL}(2, 109)$	$(109, 11)$	A_5
C_{324414}	$\text{PGL}(2, 269)$	$(269, 67)$	A_5
C_{286758}^i	$\text{PSL}(2, 179)$	$(179, 89), i \leq 85$	D_{10}

续表

C_{286758}^i	$\text{PGL}(2, 179)$	$(179, 89), i \leq 136$	D_{20}
$C_{1156698}^i$	$\text{PSL}(2, 359)$	$(359, 179), i \leq 3$	D_{20}
$C_{4646178}^i$	$\text{PSL}(2, 719)$	$(719, 359), i \leq 4$	D_{20}

2. 预备结果

下面整理若干关键基础结论, 为后续证明做准备。对素数 r , 我们需要用到 $\text{PSL}(2, r)$ 与 $\text{PGL}(2, r)$ 的极大子群分类, 该分类结果参见文献[21] [25]。

引理 2.1 设 $q \geq 5$ 为素数, $G = \text{PSL}(2, q)$ 或 $G = \text{PGL}(2, q)$ 。若 H 是 G 的极大子群, 则:

- (1) 当 $G = \text{PSL}(2, q)$ 时, $H \cong D_{q-1}, D_{q+1}, \mathbb{Z}_q : \mathbb{Z}_{(q-1)/2}, A_4, S_4$ 或 A_5 ;
- (2) 当 $G = \text{PGL}(2, q)$ 时, $H \cong D_{2(q-1)}, H \cong D_{2(q+1)}, \mathbb{Z}_q : \mathbb{Z}_{q-1}, S_4$ 或 $\text{PSL}(2, q)$ 。

下一引理给出连通五度对称图点稳定子的全部可能结构(参见文献[10] [26])。

引理 2.2 设图 Γ 为五度图, $G \leq \text{Aut}\Gamma$, G 在 Γ 上 (G, s) -传递, 且 $s \geq 1$ 。对顶点 $\alpha \in V\Gamma$, 下述情形有且仅有一种成立:

- (1) 若点稳定子 G_α 可解, 则 $s \leq 3$, 且 $|G_\alpha| \mid 80$, 点稳定子的全部可能结构如表 2 所示。下表列出五度弧传递图可解点稳定子 G_α 的全部可行结构, 来自文献已有分类结果, 将在分情形讨论中反复引用。

Table 2. Structures of soluble vertex-stabilizers

表 2. 可解情况

s	G_α	$ G_\alpha $
1	$\mathbb{Z}_5, D_{10}, D_{20}$	$5, 2 \cdot 5, 2^2 \cdot 5$
2	$F_{20}, F_{20} \times \mathbb{Z}_2$	$2^2 \cdot 5, 2^3 \cdot 5$
3	$F_{20} \times \mathbb{Z}_4$	$2^4 \cdot 5$

- (2) 若点稳定子 G_α 不可解, 则 $2 \leq s \leq 5$, 且 $|G_\alpha| \mid 2^9 \cdot 3^2 \cdot 5$; 点稳定子的全部可能结构如表 3 所示。下表给出不可解情形下点稳定子 G_α 的所有候选群结构, 是判定候选自同构群是否可行的重要依据。

Table 3. Structures of insoluble vertex-stabilizers

表 3. 不可解情况

s	G_α	$ G_\alpha $
2	A_5, S_5	$2^2 \cdot 3 \cdot 5, 2^3 \cdot 3 \cdot 5$
3	$A_4 \times A_5, (A_4 \times A_5) : \mathbb{Z}_2, S_4 \times S_5$	$2^4 \cdot 3^2 \cdot 5, 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5, 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5,$
4	$\text{ASL}(2, 4), \text{AGL}(2, 4), \text{A}\Sigma\text{L}(2, 4), \text{A}\Gamma\text{L}(2, 4)$	$2^6 \cdot 3 \cdot 5, 2^7 \cdot 3 \cdot 5, 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5, 2^7 \cdot 3^2 \cdot 5$
5	$\mathbb{Z}_2^6 : \Gamma\text{L}(2, 4)$	$2^9 \cdot 3^2 \cdot 5$

分析点传递图的一种有效手段是利用正规子群构造商图。设 Γ 是 G -点传递图, 满足 $G \leq \text{Aut}\Gamma$ 。设

$N \triangleleft G$ 是 G 的正规子群, 且 N 在顶点集 VT 上的轨道非平凡。商图 Γ_N 按如下方式定义: 将 N 的全体轨道作为 Γ_N 的顶点; 对两条轨道 B 与 C 在 Γ_N 中相邻当且仅当存在 $u \in B, v \in C$, 使得 (u, v) 在原图 Γ 中相邻。特别地, 若 $\text{val}(\Gamma) = \text{val}(\Gamma_N)$, 则称 Γ 为 Γ_N 的正规覆盖。

若对任意顶点 $\alpha \in VT$, 点稳定子 G_α 在 α 的邻域 $\Gamma(\alpha)$ 上的作用为本原作用, 则称图 Γ 是 G -局部本原图。弧传递五度图自动满足该条件, 也是本文主要研究对象。

下面的约化结论是本文分类工作的重要基础, 该结论的思想来源于文献[27] [28]。

引理 2.3 设图 Γ 的自同构群包含点传递且局部本原的子群 G 。若 G 的正规子群 N 在顶点集 VT 上至少有 3 条不同轨道, 则下述结论成立:

- (1) N 在 VT 上半正则 G/N 可以嵌入到 $\text{Aut}\Gamma_N$, 且 Γ 是 Γ_N 的正规覆盖;
- (2) 取商之后点稳定子保持同构: 即任取 $\alpha \in VT$, 记 Γ 为 α 所在的 N -轨道 $\gamma \in VT_N$, 有 $G_\alpha \cong (G/N)_\gamma$;
- (3) 对 $1 \leq s \leq 5$ 或 $s = 7$, Γ 为 (G, S) -传递图当且仅当 Γ_N 为 $(G/N, s)$ -传递图。

若对任意顶点 $\alpha \in VT$, 点稳定子 G_α 在 α 的邻域 $\Gamma(\alpha)$ 上的作用为本原作用, 则称图 Γ 是 G -局部本原图。弧传递五度图自动满足该条件, 也是本文主要研究对象。

下面的约化结论是本文分类工作的重要基础, 该结论的思想来源于文献[29]。

为构造五度对称图, 需要陪集图概念。设 G 为有限群, $H \leq G$ 为其子群, D 是 G 中若干个 H -双倍集构成的集合。陪集图 $\text{Cos}(G, H, D)$ 定义如下: 顶点集为 G 关于 H 的全体右陪集 $[G:H]$; 边集为 $\{\{Hg, Hd\} \mid g \in G, d \in D\}$ 。该图的度数为 $|D|/|H|$; 图连通当且仅当 D 生成群 G 。若

$D = D^{-1} = \{d^{-1} \mid d \in D\}$, 则陪集图是无向图。另外, 对任意 $\alpha \in \text{Aut}G$, 有同构

$\text{Cos}(G, H, D) \cong \text{Cos}(G, H^\alpha, D^\alpha)$ (参见文献[11])。

引理 2.4 设图 Γ 具有点传递自同构子群 $G \leq \text{Aut}\Gamma$, 则 $\Gamma \cong \text{Cos}(G, H, D)$, 其中 $H = G_\alpha$ 是顶点 $\alpha \in VT$ 的点稳定子, D 由 G 中所有将 α 映到其邻点的元素构成。进一步有:

- (1) Γ 连通当且仅当 D 生成群 G ;
- (2) Γ 是 G -弧传递图当且仅当 D 是单个双倍集; 若存在元素 $g \in G$ 交换 α 与其某个邻点, 则 $g^2 \in H$ 且 $D = HgH$;
- (3) Γ 的度数等于 $|D|/|H|$, 也等于指数 $|H : H \cap H^g|$ 。

由文献[18], 可以得到阶为 $18p$ 的五度对称图的全部结果。

引理 2.5 设 p 为素数, 则每一个阶为 $18p$ 的五度对称图均同构于表 4 中的某一个图。

Table 4. Pentavalent symmetric graphs of order $18p$

表 4. 阶为 $18p$ 的五度对称图

Γ	$\text{Aut}\Gamma$	条件
O_4	S_9	$p = 7$
C_{342}^1	$\text{PSL}(2, 19)$	$p = 19$
C_{342}^2	$\text{PGL}(2, 19)$	$p = 19$

结合文献[14]并做简单计算, 得到下面引理。

引理 2.6 设 $p > q \geq 5$ 为互异素数, 若 Γ 是阶为 $6pq$ 的五度对称图, 则 Γ 必为表 5 中所列图之一。

Table 5. Pentavalent symmetric graphs of order $6pq$

表 5. 阶为 $6pq$ 的五度对称图

Γ	$\text{Aut}\Gamma$	(p, q)
C_{390}	$\text{PSL}(2, 25)$	$(13, 5)$
$CD_{6pq, s}$	$D_{6pq, s} : Z_5$	$5 \mid (p-1), 5 \mid (q-1)$
C_{1218}^2	$\text{PGL}(2, 29)$	$(29, 7)$
C_{1218}^i	$\text{PGL}(2, 29)$	$(29, 7), i = 2, 3$
C_{1722}^1	$\text{PSL}(2, 41)$	$(41, 7)$
C_{2982}^1	$\text{PSL}(2, 71)$	$(71, 7)$
C_{5874}	$\text{PSL}(2, 89)$	$(89, 11)$
C_{10266}^1	$\text{PGL}(2, 59)$	$(59, 29)$
C_{10266}^i	$\text{PSL}(2, 59)$	$(59, 29), 2 \leq i \leq 7$
C_{11346}^1	$\text{PGL}(2, 61)$	$(61, 31)$
C_{11346}^i	$\text{PSL}(2, 61)$	$(61, 31), 2 \leq i \leq 7$

为完整起见，引用文献[30]给出的阶为 $2pq$ 的五度对称图分类。

引理 2.7 设 (p, q) 为互异素数且 $(q \geq 5)$ ， Γ 是阶为 $2pq$ 的五度对称图，则 Γ 同构于表 6 中某个图。

Table 6. Pentavalent symmetric graphs of order $2pq$

表 6. 阶为 $2pq$ 的五度对称图

Γ	$\text{Aut}\Gamma$	条件
O_4	S_9	$p = 7$
C_{342}^1	$\text{PSL}(2, 19)$	$p = 19$
C_{342}^2	$\text{PGL}(2, 19)$	$p = 19$

3. 主要结果

从本节直至论文末尾[31]，始终假定 Γ 是阶为 $18pq$ 的五度对称图，其中素数满足 $p > q \geq 5$ ，记 $A = \text{Aut}\Gamma$ 。由引理 2.2， $|A_\alpha| \mid 2^9 \cdot 3^2 \cdot 5$ ，于是 $|A| = 2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot p \cdot q$ 。设 R 为群 A 的可解根基。证明分下面两种情形展开。

情形 1：假设 A 的可解根基平凡，即 $R = 1$ 。

本情形由下面三条引理完成分析。

引理 3.1 若 $R = 1$ ，则 A 是几乎单群。此时， A 的基座 Γ 在顶点集 $V\Gamma$ 上至多有两条轨道，并且 $5 \mid |T_\alpha|$ 。

证明：设 N 为群 A 的极小正规子群，则必存在整数 $d \geq 1$ ，使得 $N \cong T^d$ ，这里 T 代表一个非交换单群。倘若 N 作用在顶点集 $V\Gamma$ 上是半正则的，那么 $18pq \mid |N|$ 。鉴于 T 属于不可解群，可推出 $|T| = 18pq$ ，然而阶取该形式的群一定可解，由此导出矛盾。所以 N 在 $V\Gamma$ 上的作用不满足半正则条件。根据引理 2.3，

集合 $V\Gamma$ 最多可拆分为两条 N -轨道, 由此可知 $9pq \mid |N|$ 整除。同时 Γ 是连通图, 且 N 是 A 非平凡正规子群, 那么 $N^{\Gamma(\alpha)}$ 就是 $A^{\Gamma(\alpha)}$ 的非平凡正规子群。据此能够得到 $5 \mid |N_\alpha|$, 进一步推出 $45pq \mid |N|$ 。已知 $p > 5$, 因此素数 $p \mid |N|$ 。又 $|A|$ 是 $2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot p \cdot q$ 的因子, 故 p^2 不能整除 $|N|$, 于是 $d = 1$ 。这就说明 A 是几乎单群, 其极小正规子群 $N = T$ 为非交换单群。

引理 3.2 令 T 为非交换单群, 若 T 满足 $5 \cdot 3^2 \cdot p \cdot q \mid |T|$ 且 $|T| \mid 2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot p \cdot q$, 则所有满足该约束条件的群全部罗列在表 7 之中。下表列出满足阶条件的全部非交换单群候选集合, 由 Atlas 与 Magma 筛选得到, 作为几乎单群情形讨论基础。

Table 7. Non-abelian simple groups satisfying the conditions $\{2, 3, 5, p, q\}$

表 7. 非交换单 $\{2, 3, 5, p, q\}$ -群

T	阶分解	(p, q)
A_{10}	$2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$	$(7, 5)$
J_2	$2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$	$(7, 5)$
M_{22}	$2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$	$(11, 7)$
$\text{PSL}(2, 2^6)$	$2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$	$(13, 7)$
$\text{PSp}(4, 2^2)$	$2^8 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 17$	$(17, 5)$
$\text{PSL}(2, r)$	$r(r^2 - 1)/2, r \equiv \pm 1 \pmod{5}$	--

对于交错群 A_n , 只有 A_{10} 满足阶的约束条件。对于散在单群, 仅 J_2 与 M_{22} 符合条件。设 T 为定义在有限域 $\text{GF}(p^f)$ 上的李型单群。则 $F_4(q)$, $E_6(q)$, $E_7(q)$, E_8 以及扭型群 ${}^2E_6(q)$ 均可排除, 它们的阶均含有因子 q^{11} , 与题设矛盾。若 $T = G_2(q)$, 则 $q^6 \mid |T|$, 仅 $G_2(2)$ 有可能, 但 $5 \nmid |G_2(2)|$ 。对于铃木群 ${}^2B_2(q)$, 其中 $q = 2^{2m+1} \geq 8$, 虽然 ${}^2B_2(8), {}^2B_2(32)$ 满足 $q^2 \mid |T|$, 但二者阶均不含因子 9。对于 ${}^3D_4(q)$, 条件 $q^2 \mid |T|$ 与阶上界冲突。考察 Ree 群 ${}^2G_2(q)$, 其中 $q = 3^{2m+1} \geq 27$, 此时 $q^3 \mid |T|$, 同样超出阶的限制。对于扭群 ${}^2F_4(q)$, $q = 2^{2m+1} \geq 8$, 则有 $2^{36} \mid |T|$, 矛盾。因此 T 不属于例外李型群, 余下只需考虑典型李型单群。借助《群 Atlas》以及 Magma 软件检验, 得到表 7 中的全部群。

引理 3.3 设 A 为几乎单群, 则 Γ 同构于表 1 中的某个图。

证明: 记对应群的基座为 $\text{Soc}(A)$ 。因 A 是几乎单群, 故存在非交换有限单群 T 满足。由 $|T| \mid |A| \mid 2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot p \cdot q$, 可得 $|T| \mid 2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot p \cdot q$ 。根据引理 3.1, T 在顶点集 $V\Gamma$ 上至多含两条轨道, 因此 $9pq \mid |T|$ 。结合 $5 \mid |T_\alpha|$ 可知 $5 \mid |T|$, 从而 $45pq \mid |T|$ 。依据引理 3.2, T 只能为表 7 所列的候选单群。下面对各候选群逐一进行讨论。

设 $T \cong A_{10}, J_2, M_{22}, \text{PSL}(2, 2^6)$ 或 $\text{PSp}(4, 2^2)$ 。查阅《群 Atlas》[30], 对应的外自同构群依次为 $\text{Out}(T) = \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_4$, 于是 $A \cong T.O$, 其中 $O \leq \text{Out}(T)$ 。由文献[26], 上述各群的阶分别为 $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$, $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$, $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$, $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$, $2^8 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 17$ 。又 $|A| = |T| \cdot m$, 其中 $m = |O|$, 且 $18pq = |A : A_\alpha|$ 以及 $5 \mid |A_\alpha|$, 据此可算出各点稳定子 α 的阶。若 $T \cong A_{10}, J_2, M_{22}$, 则 $|A_\alpha| = \frac{|A|}{18pq} = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5$, $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5$, $2^6 \cdot 3 \cdot 5$, $2^7 \cdot 3 \cdot 5$, $2^6 \cdot 5$, $2^7 \cdot 5$; 若 $T \cong \text{PSL}(2, 2^6)$ 或 $\text{PSp}(4, 2^2)$, 则 $|A_\alpha| = \frac{|A|}{18pq} = \frac{|T| \cdot m}{18pq} = 2^5 \cdot 5 \cdot m$

或 $2^7 \cdot 5 \cdot m$ 。对照引理 2.2, 上述所有点稳定子的阶均不满足相应条件, 从而导出矛盾, 故此类情形不可能出现。

现设 $T \cong \text{PSL}(2, r)$, 其中 $r \equiv \pm 1 \pmod{5}$ 。此时 $\text{Out}(T) \cong \mathbb{Z}_2$, 故 $A = \text{PSL}(2, r)$ 或 $A = \text{PGL}(2, r)$ 。 T 在顶点集 $V\Gamma$ 上至多含有两条轨道, 且 $|T| = 60 \cdot 9pq$ 或 $60 \cdot 18pq$, 因此 $|T|$ 中素因子 2、3、4 的次数分别至多为 $(10, 4, 2)$ 。由 $5 \mid |T| = |\text{PSL}(2, r)| = \frac{r(r-1)(r+1)}{2}$, 得 $10 \mid r^2 - 1$, 即 $r \equiv \pm 1 \pmod{5}$, 且 $r = p$ 。注意到 $\gcd\left(\frac{p-1}{2}, \frac{p+1}{2}\right) = 1$, 分两种子情形讨论: 若 $q \mid p+1$, 则 $p-1 = 2^i \cdot 3^j \cdot 5^k$, 且 $9 \mid (p-1)(p+1)$; 若 $q \mid p-1$, 则 $p+1 = 2^i \cdot 3^j \cdot 5^k$, 其中指数满足 $0 \leq i \leq 10, 0 \leq j \leq 4, 1 \leq k \leq 2$, 且 $p > q \geq 5$ 均为素数。直接计算得候选素数 $p \in \{71, 89, 109, 179, 269, 271, 359, 431, 541, 719, 809, 1279, 1439, 1619, 1621, 2879\}$, 全部候选情形列于表 8。

Table 8. Candidate almost simple groups $\text{PSL}(2, r)$

表 8. 候选 $\text{PSL}(2, r)$ 群

$\text{PSL}(2, r)$	阶分解	N	阶分解
$\text{PSL}(2, 71)$	$23 \cdot 32 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 71$	$\text{PSL}(2, 541)$	$22 \cdot 33 \cdot 5 \cdot 271 \cdot 541$
$\text{PSL}(2, 89)$	$23 \cdot 32 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 89$	$\text{PSL}(2, 719)$	$24 \cdot 32 \cdot 5 \cdot 359 \cdot 719$
$\text{PSL}(2, 109)$	$22 \cdot 33 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 109$	$\text{PSL}(2, 809)$	$23 \cdot 34 \cdot 5 \cdot 101 \cdot 809$
$\text{PSL}(2, 179)$	$22 \cdot 32 \cdot 5 \cdot 89 \cdot 179$	$\text{PSL}(2, 1279)$	$28 \cdot 32 \cdot 5 \cdot 71 \cdot 1279$
$\text{PSL}(2, 269)$	$22 \cdot 33 \cdot 5 \cdot 67 \cdot 269$	$\text{PSL}(2, 1439)$	$25 \cdot 32 \cdot 5 \cdot 719 \cdot 1439$
$\text{PSL}(2, 271)$	$24 \cdot 33 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 271$	$\text{PSL}(2, 1619)$	$22 \cdot 34 \cdot 5 \cdot 809 \cdot 1619$
$\text{PSL}(2, 359)$	$23 \cdot 32 \cdot 5 \cdot 179 \cdot 359$	$\text{PSL}(2, 1621)$	$22 \cdot 34 \cdot 5 \cdot 811 \cdot 1621$
$\text{PSL}(2, 431)$	$24 \cdot 33 \cdot 5 \cdot 43 \cdot 431$	$\text{PSL}(2, 2879)$	$26 \cdot 32 \cdot 5 \cdot 1439 \cdot 2879$

对素数 $p \in \{71, 89, 271, 431, 809, 1279, 1439, 1619, 1621, 2879\}$, 由《群 Atlas》[30]可知单群 $T = \text{PSL}(2, p)$ 的外自同构群满足 $\text{Out}(T) = \mathbb{Z}_2$ 。此时几乎单群 $A = \text{Aut}\Gamma$ 可表示为 $A \cong T.O$, 其中 O 为 $\text{Out}(T)$ 的子群。对应群 A 的阶依次为:

$$\begin{aligned}
 |A| = & 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 71 \cdot m, 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 89 \cdot m, 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 271 \cdot m, 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 43 \cdot 431 \cdot m, \\
 & 2^3 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 101 \cdot 809 \cdot m, 2^8 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 71 \cdot 1279 \cdot m, 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 719 \cdot 1439 \cdot m, \\
 & 2^2 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 809 \cdot 1619 \cdot m, 2^2 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 811 \cdot 1621 \cdot m, 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 1439 \cdot 2879 \cdot m.
 \end{aligned}$$

根据式中 $m = |O| \in \{1, 2\}$, 并且结合图论基本关系 $18pq = |A : A_\alpha|$ 与整除条件 $5 \mid |A_\alpha|$, 可唯一确定点稳定子群 A_α 的阶, 并结合引理 2.2 判定其群结构。以 $T \cong \text{PSL}(2, 71)$ 与 $T \cong \text{PSL}(2, 89)$ 为例, 两类情形下均有 $|A_\alpha| = 2^2 \cdot 5$ 或 $2^3 \cdot 5$, 由引理 2.2 可得 (m, A_α) 的可行组合为 $(1, D_{20})$ 与 $(2, F_{20} \times \mathbb{Z}_2)$ 。其余素数对应的候选单群均可通过相同方法完成分析。

本文使用 GAP 与 Magma 做辅助计算的实现思路简述: 调用软件内置有限单群群库构造候选基座群, 利用子群搜索函数筛选满足阶条件的子群作为候选点稳定子 G_α , 进一步构造陪集图, 检验图的连通性与度数条件, 并核验自同构群的弧传递性质, 以此校验理论推导得到的候选对象。借助 GAP [23] 与 Magma [24] 开展群论数值验证, 结果表明上述所有情形中, 几乎单群 $A \cong T.O$ 均不存在同构于对应候选结构的点

稳定子群 A_α , 由此导出矛盾, 该组情形全部无解。进一步讨论

$T \in \{\text{PSL}(2,109), \text{PSL}(2,179), \text{PSL}(2,269), \text{PSL}(2,359), \text{PSL}(2,719)\}$ 的情形, 此类单群同样满足 $\text{Out}(T) = \mathbb{Z}_2$, 即 $m = |O| \in \{1, 2\}$ A 且 $m = |O| \in \{1, 2\}$, 群 A 的阶依次为: $|A| = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 109 \cdot m$, $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 89 \cdot 179 \cdot m$, $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 67 \cdot 269 \cdot m$, $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 179 \cdot 359 \cdot m$, $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 359 \cdot 719 \cdot m$ 。同理结合 $|A: A_\alpha| = 18pq$ 以及 $5 \nmid |A_\alpha|$ 计算 $|A_\alpha|$, 再通过引理 2.2 锁定点稳定子群的具体结构。

当 $T \cong \text{PSL}(2,109)$ $R \neq 1$ $18 \cdot 109 \cdot 11 = 21582$ 或 $T \cong \text{PGL}(2,109)$ 时, 由引理 2.2 可确定 $|A_\alpha| = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, 即 $A_\alpha \cong A_5$ 为唯一可行结构。经 GAP 与 Magma 验算, 当 $\text{Aut}\Gamma \cong \text{PGL}(2,109)$ 时, 存在唯一阶数为 $18 \cdot 109 \cdot 11 = 21582$ 的五度对称图, 记为 $\mathcal{C}_{21582}$ 。

当 $T \cong \text{PSL}(2,179)$ 或 $T \cong \text{PGL}(2,179)$ 时, 引理 2.2 给出 $|A_\alpha| = 2 \cdot 5$ 或 $2^2 \cdot 5$, 对应 $A_\alpha \cong D_{10}$ 或 D_{20} 。依据引理 2.4, 利用 GAP 系统检索满足条件的 2 阶元 g , 计算得 $\text{PSL}(2,179)$ 中至多包含 85 个有效 2 阶元, 对应至多 85 个候选图; $\text{PGL}(2,179)$ 中至多包含 136 个有效 2 阶元, 对应至多 136 个候选图。剩余候选单群均可采用相同流程分析, 结合 GAP 与 Magma 的全部计算结果, 可汇总得到表 1 的全部结论。

综上, 所有候选情形分析完毕, 定理得证。

情形 2: 假设 A 的可解根基非平凡, 即 $R \neq 1$ 。在此前提下, 给出关于可解极小正规子群的关键引理。

引理 3.4 设素数满足 $5 \leq q < p$ 。若 A 含有可解的极小正规子群, 则不存在阶为 $18pq$ 的五度对称图。

证明: 设 N 是 A 的可解极小正规子群, 则 $N \trianglelefteq A$ 。于是存在素数 r 和正整数 d , 使得 $N \cong \mathbb{Z}_r^d$, 并且 N 在顶点集 $V\Gamma$ 上至少有 3 条轨道。由引理 2.3, N 在 $V\Gamma$ 上半正则, 故 $|N| \mid 18pq$ 。结合素数条件 $p > q \geq 5$, 得 $N \cong \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_3^2, \mathbb{Z}_q$ 或 $\mathbb{Z}_p$ 。

子情形 1: $N \cong \mathbb{Z}_2$

依据引理 2.3, 商图 Γ_N 的阶为 $9pq$, 是五度的 A/N 弧传递图。奇数阶的对称图度数必为偶数, 但 Γ_N 的度数为 5, 矛盾。因此该子情形不可能发生。当通过商群 A/N 的群结构复原原群 A 时, 结合本论文阶 $18pq$ 的算术条件以及基座性质, 可以判定: 该阶条件下不存在非分裂群扩张, 因此只需要考虑直积与半直积两种群扩张, 针对半直积情形, 文中会明确给出正规子群上的自同构作用, 以此确定群结构, 排除结构歧义。

子情形 2: $N \cong \mathbb{Z}_3$

由引理 2.3, Γ_N 是阶为 $6pq$ 的五度 A/N -弧传递图, 满足引理 2.7 的条件。 A/N 在 Γ_N 上的弧传递性给出 $30pq \mid |A/N|$ 。又 $A/N \leq \text{Aut}(\Gamma_N)$, 故 $30pq \mid |\text{Aut}\Gamma_N|$ 。于是 Γ_N 只能是 $\mathcal{C}_{390}$ 、 $\mathcal{CD}_{6pq,s}$ 、 $\mathcal{C}_{1218}^1$ 、 $\mathcal{C}_{1218}^i (i=2,3)$ 、 $\mathcal{C}_{1722}$ 、 $\mathcal{C}_{2982}$ 、 $\mathcal{C}_{5874}$ 、 $\mathcal{C}_{10266}$ 、 $\mathcal{C}_{10266}^i (2 \leq i \leq 7)$ 、 $\mathcal{C}_{11346}^1$ 或 $\mathcal{C}_{11346}^i (2 \leq i \leq 7)$ 。

若 $\Gamma_N \cong \mathcal{C}_{390}$ 、 $\mathcal{C}_{1218}^1$ 、 $\mathcal{C}_{1218}^i (i=2,3)$ 、 $\mathcal{C}_{1722}$ 、 $\mathcal{C}_{2982}$ 、 $\mathcal{C}_{10266}^i (2 \leq i \leq 7)$ 或 $\mathcal{C}_{11346}^i (2 \leq i \leq 7)$, 对应的素数对 (p,q) 依次为 $(13,5)$ 、 $(29,7)$ 、 $(29,7)$ 、 $(41,7)$ 、 $(71,7)$ 、 $(59,29)$ 或 $(61,31)$; 对应的自同构群 $\text{Aut}\Gamma_N$ 分别同构于 $\text{PSL}(2,25)$, $\text{PGL}(2,29)$, $\text{PSL}(2,29)$, $\text{PGL}(2,41)$, $\text{PSL}(2,71)$, $\text{PSL}(2,59)$, $\text{PSL}(2,61)$ 。由 Γ_N 的弧传递性可以还原 A 的群结构。利用 $18pq = |A: A_\alpha|$ 得到 $|A_\alpha| = |A|/(18pq)$, 再由引理 2.2 确定点稳定子 A_α 的结构。以 $\Gamma_N \cong \mathcal{C}_{390}$ 为例, $A \cong \mathbb{Z}_3 \times \text{PSL}(2,25)$, 此时 $|A_\alpha| = 20$, $A_\alpha \cong D_{20}$ 。若 $\Gamma_N \cong \mathcal{C}_{1218}^1$, 则 $A \cong \mathbb{Z}_3 \times \text{PGL}(2,29)$ 或 $\text{PSL}(2,29): S_3$, $|A_\alpha| = 10$, $A_\alpha \cong D_{10}$ 。其余情形可同理分析。但 GAP 计算表明, 上述每一种情形下, 群 A 均不存在满足要求的同构于 A_α 的子群, 导出矛盾。

若 $\Gamma_N \cong \mathcal{C}_{5874}$ 、 $\mathcal{C}_{10266}$ 或 $\mathcal{C}_{11346}$, 则对应素数对 (p,q) 为 $(89,11)$ 、 $(59,29)$ 或 $(61,31)$, 而且 $\text{Aut}\Gamma_N$ 分别为 $\text{PSL}(2,89)$ 、 $\text{PGL}(2,59)$ 或 $\text{PGL}(2,61)$ 。由弧传递性得到 A 的结构, 引理 2.2 给出 A_α 。以 $\Gamma_N \cong \mathcal{C}_{5874}$ 为例,

$A \cong \mathbb{Z}_3 \times \text{PSL}(2, 89)$, $|A_\alpha| = 60$, $A_\alpha \cong A_5$ 。借助 GAP 与 Magma 搜索引理 2.4 所述的 2-阶元 g , 在 $\text{PSL}(2, 89)$ 中没有找到这样的元素, 故 $A \cong \mathbb{Z}_3 \times \text{PSL}(2, 89)$ 不能给出图 Γ 。同理, 在 $\mathbb{Z}_3 \times \text{PGL}(2, 59)$, $\text{PSL}(2, 59):S_3$, $\mathbb{Z}_3 \times \text{PSL}(2, 59)$, $\mathbb{Z}_3 \times \text{PGL}(2, 61)$ 或 $\text{PSL}(2, 61):S_3$ 中均不存在满足引理 2.4 的 2-阶元, 矛盾。

若 $\Gamma_N \cong \text{CD}_{6pq,5}$, 则 $\text{Aut}\Gamma_N \cong D_{6pq}:\mathbb{Z}_5$ 。因为 A/N 是 $\text{Aut}\Gamma_N$ 的弧传递子群, 故 $30pq \mid |A/N| \mid |D_{6pq}:\mathbb{Z}_5|$, 于是只能有 $A/N = D_{6pq}:\mathbb{Z}_5$ 。记 H 为 D_{6pq} 中阶为 pq 的正规子群, P 是 H 的 Sylow p -子群。由 Sylow 定理, P 在 H 中是特征子群; 结合 $H \trianglelefteq D_{6pq}$, 得 $P \trianglelefteq D_{6pq}$ 。又 P 是 D_{6pq} 的 Sylow p -子群, 故 P 在 D_{6pq} 中特征, 而 $D_{6pq} \trianglelefteq A/N$, 因此 $P \trianglelefteq A/N$ 。由条件 $p > q \geq 5$, $5 \mid p-1$ 且 $5 \mid q-1$, 故 $q \geq 11$, P 是 A/N 的 Sylow p -子群。令 $P = G/N$, 则 $G/N \cong \mathbb{Z}_p$, $|G| = 3p$ 。由 Sylow 定理, G 有正规 Sylow p -子群 $M \cong \mathbb{Z}_p$, 于是 $G = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_p = N \times M$ 。注意到 $G \trianglelefteq A$, 故 $M \trianglelefteq A$, 从而商图 Γ_M 是阶为 $18q$ 的五度对称图。由引理 2.5, $q = 7$ 或 19 不满足条件, 且要求 $5 \mid q-1$, 故不存在这样的图, $\Gamma_N \cong \text{CD}_{6pq,5}$ 这一情形被排除。阶为 $6pq$ 的全部正规商图都导出矛盾, 因此当 $N \cong \mathbb{Z}_3$ 时, 不存在阶为 $18pq$ 的五度对称图。

子情形 3: $N \cong \mathbb{Z}_3^2$

引理 2.3 给出 Γ_N 是阶为 $2pq$ 的五度 A/N -弧传递图, 满足引理 2.7。 A/N 在 Γ_N 上传递, 故 $10pq \mid |A/N|$ 。又 $A/N \leq \text{Aut}\Gamma_N$, 于是 $10pq \mid |\text{Aut}\Gamma_N|$, 因此 $\Gamma_N \cong \mathcal{C}_{574}$ 、 $\mathcal{C}_{406}$ 、 $\mathcal{C}_{3422}$ 、 $\mathcal{C}_{3782}$ 或 $\mathcal{C}_{170}$ 。

若 $\Gamma_N \cong \mathcal{C}_{574}$, 则 $(p, q) = (41, 7)$, $\text{Aut}\mathcal{C}_{574} \cong \text{PSL}(2, 41)$ 。由弧传递性, $A/N \cong \text{PSL}(2, 41)$, 于是 $A = \mathbb{Z}_3^2 \times \text{PSL}(2, 41)$ 计算得 $|A_\alpha| = \frac{|A|}{18 \cdot 7 \cdot 41} = 60$ 。根据引理 2.2, $A_\alpha \cong A_5$ 。但是 $\text{PSL}(2, 41)$ 不存在 60 阶子群, 矛盾。故 $\Gamma_N \not\cong \mathcal{C}_{574}$ 。

若 $\Gamma_N \cong \mathcal{C}_{406}, \mathcal{C}_{3422}, \mathcal{C}_{3782}$, 对应 $(p, q) = (29, 7), (59, 29), (61, 31)$, $A/N \leq \text{Aut}\Gamma_N$; 由弧传递性, $A/N \cong \text{PGL}(2, 29), \text{PGL}(2, 59), \text{PGL}(2, 61)$ 。由此可以得到 A 的群结构。由 $18pq = |A:A_\alpha|$, $|A_\alpha| = |A|/18pq$, 再由引理 2.2 确定 A_α 。以 $\Gamma_N \cong \mathcal{C}_{406}$ 为例, $A/N \cong \text{PGL}(2, 29)$, 则 $A \cong \mathbb{Z}_3^2 \times \text{PSL}(2, 29)$, $\mathbb{Z}_3^2 \times \text{PGL}(2, 29)$, $\mathbb{Z}_3^2 \times (\mathbb{Z}_3:\text{PGL}(2, 29))$, $\mathbb{Z}_3:(\mathbb{Z}_3:\text{PGL}(2, 29))$, 此时 $|A_\alpha| = \frac{|A|}{18 \cdot 29 \cdot 7} = 30$ 或 60 , 引理 2.2 给出 $A_\alpha \cong A_5$ 。利用 GAP、Magma 搜索引理 2.4 中的 2-阶元 g , 计算返回空结果, 即 $\text{PGL}(2, 29)$ 中没有满足条件的 2-阶元, 故 $A \cong \mathbb{Z}_3^2 \times \text{PGL}(2, 29)$ 不能实现图 Γ 。同理, $\mathbb{Z}_3^2 \times \text{PSL}(2, 59)$, $\mathbb{Z}_3^2 \times \text{PGL}(2, 59)$, $\mathbb{Z}_3^2 \times (\mathbb{Z}_3:\text{PGL}(2, 59))$, $\mathbb{Z}_3:(\mathbb{Z}_3:\text{PGL}(2, 59))$, $\mathbb{Z}_3^2 \times \text{PSL}(2, 61)$, $\mathbb{Z}_3^2 \times \text{PGL}(2, 61)$, $\mathbb{Z}_3^2 \times (\mathbb{Z}_3:\text{PGL}(2, 61))$, $\mathbb{Z}_3:(\mathbb{Z}_3:\text{PGL}(2, 61))$ 中均无满足引理 2.4 的 2-阶元, 矛盾。

最后讨论 $\Gamma_N \cong \mathcal{C}_{170}$, 此时 $(p, q) = (17, 5)$, $\text{Aut}\mathcal{C}_{170} \cong \text{PSp}(4, 4).\mathbb{Z}_4$ 。由于 $\text{PSp}(4, 4)$ 在 $V\Gamma_N$ 上非传递, 故 $\text{PSp}(4, 4).\mathbb{Z}_2 \leq A/N \leq \text{PSp}(4, 4).\mathbb{Z}_4$ 该群的 Schur 乘子平凡, 因此 $A = \mathbb{Z}_3^2 \times \text{PSp}(4, 4).\mathbb{Z}_2$, $A = \mathbb{Z}_3^2 \times \text{PSp}(4, 4).\mathbb{Z}_4$, 于是 A 含有正规子群。验算可知 M 在 $V\Gamma$ 上至多 2 条轨道, 得到 $|M_\alpha| = 640$ 或 1280 。Magma 计算表明 $\text{PSp}(4, 4)$ 不存在 640 阶与 1280 阶子群, 矛盾。

子情形 4: $N \cong \mathbb{Z}_q$

由引理 2.3, 正规商图 Γ_N 是阶为 $18p$ 的五度 (A/N) -弧传递图, 满足引理 2.5 的条件。 A/N 在 Γ_N 上传递, 故 $90p \mid |A/N|$ 。又 $A/N \leq \text{Aut}\Gamma_N$, 于是 $90p \mid |\text{Aut}\Gamma_N|$, 因此 $\Gamma_N \cong \mathcal{O}_4, \mathcal{C}_{342}^1$ 或 $\mathcal{C}_{342}^2$ 。从而 $A/N \leq \text{Aut}\Gamma_N \cong S_9, \text{PSL}(2, 19)$ 或 $\text{PGL}(2, 19)$ 。于是 $A \cong \mathbb{Z}_q.S_9, \mathbb{Z}_q.\text{PSL}(2, 19)$ 或 $\mathbb{Z}_q.\text{PGL}(2, 19)$ 。可以得到 A 的正规子群 H , 满足 $H = \mathbb{Z}_q \times A_9$ 或者 $H = \mathbb{Z}_q \times \text{PSL}(2, 19)$ 。记 $M = H'$ 为 H 的换位子群, 则 $M = A_9$ 或 $M = \text{PSL}(2, 19)$ 。 M 在 $V\Gamma$ 上至多两条轨道, 故 $9pq \mid |M|$ 。当 $p = 7$ 或 19 时, 得到 $q = 5$ 。现在基于群 A 分析点稳定子 H 的可能结构, 分情形展开讨论。若 $A \cong \mathbb{Z}_5.S_9$, 则 H 的可能同构类型为

$\mathbb{Z}_5 \times A_9, \mathbb{Z}_5 \times S_7, \mathbb{Z}_5 \times (\mathbb{Z}_2 \times A_7), \mathbb{Z}_5 \times (\mathbb{Z}_2 \times S_7), \mathbb{Z}_5 \times A_8, \mathbb{Z}_5 \times S_8, \mathbb{Z}_5 \times A_9, \mathbb{Z}_5 \times S_9$ 。若 $A \cong \mathbb{Z}_5 \cdot \text{PSL}(2, 19)$ 则 $H = \mathbb{Z}_5 \times \text{PSL}(2, 19)$ 。

若 $A \cong \mathbb{Z}_5 \cdot \text{PGL}(2, 19)$, 则 A 同构于 $\mathbb{Z}_5 \times \text{PGL}(2, 19)$ 或者 $\text{PGL}(2, 19): D_{10}$ 。相应地, H 可能同构于 $\mathbb{Z}_5 \times A_9, \mathbb{Z}_5 \times \text{PSL}(2, 19), \mathbb{Z}_5 \times \text{PGL}(2, 19), \text{PGL}(2, 19): D_{10}$ 。借助 Magma 验算, $N \cong \mathbb{Z}_q$ 这一子情形下不存在满足条件的图。

子情形 5: $N \cong \mathbb{Z}_p$

该子情形与 $N \cong \mathbb{Z}_q$ 对称, 同理可得: 不存在对应的图。 N 的全部可能选取均导出矛盾, 因此可得到: 当可解根基 $R \neq 1$ 时, 阶为 $18pq$ 的五度对称图不存在。至此情形 2 证明完毕。于是主定理 1 成立。对素数 $p > q \geq 5$, 所有此类图均出现在情形 1, 情形 2 中没有解。

4. 结论

本文完成了素数满足 $p > q \geq 5$ 条件下阶 $18pq$ 的连通五度对称图的完全分类。证明表明, 满足条件的连通五度对称图仅存在于自同构群为几乎单群的情形; 若自同构群的可解根基非平凡, 则不存在这样的图。全部图同构类、自同构群、点稳定子 G_α 及对应的素数约束汇总于表 1。本文仅讨论 $p > q \geq 5$ 。当 $q = 2, 3$ 时, 群阶算术条件改变, 点稳定子和候选单群集合均会发生变化, 属于另一独立分类问题, 留作后续研究。文中采用的正规商约化结合有限单群分类定理的思路, 可为其他复合阶五度对称图分类提供参考。将该方法推广至其他阶或其他度数时, 点稳定子结构显著复杂化, 候选单群数目激增, 相关分类工作仍存在挑战, 值得继续探究。

参考文献

- [1] Tutte, W.T. (1947) A Family of Cubical Graphs. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, **43**, 459-474. <https://doi.org/10.1017/s0305004100023720>
- [2] Tutte, W.T. (1959) On the Symmetry of Cubic Graphs. *Canadian Journal of Mathematics*, **11**, 621-624. <https://doi.org/10.4153/cjm-1959-057-2>
- [3] Chao, C. (1971) On the Classification of Symmetric Graphs with a Prime Number of Vertices. *Transactions of the American Mathematical Society*, **158**, 247-256. <https://doi.org/10.1090/s0002-9947-1971-0279000-7>
- [4] Praeger, C.E., Wang, R.J. and Xu, M.Y. (1993) Symmetric Graphs of Order a Product of Two Distinct Primes. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, **58**, 299-318. <https://doi.org/10.1006/jctb.1993.1046>
- [5] Praeger, C.E. and Xu, M.Y. (1993) Vertex-Primitive Graphs of Order a Product of Two Distinct Primes. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, **59**, 245-266. <https://doi.org/10.1006/jctb.1993.1068>
- [6] Wang, R.J. and Xu, M.Y. (1993) A Classification of Symmetric Graphs of Order $3p$. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, **58**, 197-216. <https://doi.org/10.1006/jctb.1993.1037>
- [7] Li, C.H. (2001) On Finite S-Transitive Graphs of Odd Order. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, **81**, 307-317. <https://doi.org/10.1006/jctb.2000.2012>
- [8] Conder, M. and Dobcsányi, P. (2002) Trivalent Symmetric Graphs on up to 768 Vertices. *The Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing*, **40**, 41-63.
- [9] Zhou, J.X. and Feng, Y.Q. (2009) Tetravalent One-Regular Graphs of Order $2pq$. *Journal of Algebraic Combinatorics*, **29**, 457-471. <https://doi.org/10.1007/s10801-008-0146-z>
- [10] Zhou, J.X. and Feng, Y.Q. (2010) On Symmetric Graphs of Valency Five. *Discrete Mathematics*, **310**, 1725-1732. <https://doi.org/10.1016/j.disc.2009.11.019>
- [11] Alaeiyan, M. and Akbarizadeh, M. (2019) Classification of the Pentavalent Symmetric Graphs of Order $18p$. *Indian Journal of Pure and Applied Mathematics*, **50**, 485-497. <https://doi.org/10.1007/s13226-019-0340-9>
- [12] Guo, S.T., Zhou, J.X. and Feng, Y.Q. (2011) Pentavalent Symmetric Graphs of Order $12p$. *The Electronic Journal of Combinatorics*, **18**, P233. <https://doi.org/10.37236/720>
- [13] Hua, X.H. and Feng, Y.Q. (2011) Pentavalent Symmetric Graphs of Order $8p$. *Journal of Beijing Jiaotong University*, **35**, 132-135, 141. (In Chinese)

-
- [14] Hua, X.H., Feng, Y. and Lee, J. (2011) Pentavalent Symmetric Graphs of Order $2pq$. *Discrete Mathematics*, **311**, 2259-2267. <https://doi.org/10.1016/j.disc.2011.07.007>
 - [15] Ling, B. (2017) Classifying Pentavalent Symmetric Graphs of Order $24p$. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, **43**, 1855-1866.
 - [16] Ling, B., Wu, C.X. and Lou, B.G. (2014) Pentavalent Symmetric Graphs of Order $30p$. *Bulletin of the Australian Mathematical Society*, **90**, 353-362. <https://doi.org/10.1017/s0004972714000616>
 - [17] Pan, J., Lou, B. and Liu, C. (2013) Arc-Transitive Pentavalent Graphs of Order $4pq$. *The Electronic Journal of Combinatorics*, **20**, P36. <https://doi.org/10.37236/2373>
 - [18] Ding, S.Y., Ling, B., Lou, B. and Pan, J. (2016) Arc-Transitive Pentavalent Graphs of Square-Free Order. *Graphs and Combinatorics*, **32**, 2355-2366. <https://doi.org/10.1007/s00373-016-1717-8>
 - [19] Li, Y.T. and Feng, Y.Q. (2010) Pentavalent One-Regular Graphs of Square-Free Order. *Algebra Colloquium*, **17**, 515-524. <https://doi.org/10.1142/s1005386710000490>
 - [20] Meymandi, M.A., Alaeiyan, M. and Scapellato, R. (2022) Classification of the Pentavalent Symmetric Graphs of Order $8pq$. *International Journal of Group Theory*, **11**, 259-270.
 - [21] Dickson, L.E. (1958) Linear Groups with an Exposition of the Galois Field Theory. Dover.
 - [22] Robinson, D.J. (1982) A Course in the Theory of Groups. Springer-Verlag.
 - [23] The GAP Group, GAP-Groups (2024) Algorithms, and Programming, Version 4.13.1. <https://www.gap-system.org/>
 - [24] Bosma, W., Cannon, J. and Playoust, C. (1997) The MAGMA Algebra System I: The User Language. *Journal of Symbolic Computation*, **24**, 235-265. <https://doi.org/10.1006/jsco.1996.0125>
 - [25] Cameron, P.J., Omid, G.R. and Tayfeh-Rezaie, B. (2006) 3-Designs from $PGL(2, q)$. *The Electronic Journal of Combinatorics*, **13**, R50. <https://doi.org/10.37236/1076>
 - [26] Guo, S. and Feng, Y. (2012) A Note on Pentavalent s -Transitive Graphs. *Discrete Mathematics*, **312**, 2214-2216. <https://doi.org/10.1016/j.disc.2012.04.015>
 - [27] Li, C.H. and Pan, J.M. (2008) Finite 2-Arc-Transitive Abelian Cayley Graphs. *European Journal of Combinatorics*, **29**, 148-158. <https://doi.org/10.1016/j.ejc.2006.12.001>
 - [28] Praeger, C.E. (1993) An O'nan-Scott Theorem for Finite Quasiprimitive Permutation Groups and an Application to 2-Arc Transitive Graphs. *Journal of the London Mathematical Society*, **2**, 227-239. <https://doi.org/10.1112/jlms/s2-47.2.227>
 - [29] Sabidussi, G. (1964) Vertex-Transitive Graphs. *Monatshefte für Mathematik*, **68**, 426-438. <https://doi.org/10.1007/bf01304186>
 - [30] Conway, J.H., Curtis, R.T., Norton, S.P., Parker, R.A. and Wilson, R.A. (1985) Atlas of Finite Groups. Oxford University Press.
 - [31] Gorenstein, D. (1982) Finite Simple Groups. Plenum Press.